

Druhy zranění pro disciplínu ZPV kategorie dorostu ročník 2008 - 2009

KŘEČE, EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT	
Příznaky	1. Křeče trvající cca 3 minuty, pěna z úst 2. Rozšířené, na světlo nereagující zornice až bezvědomí 3. Citlivost na lehký tlak, zmatenost
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárničky)	1. Fixovat hlavu, chráníme postiženého před sebepoškozením a poraněním, mezi čelisti vložíme kapesník, abychom zamezili překousnutí jazyka 2. Uvolníme oděv a zajistíme přísun čerstvého vzduchu 3. Udržíme průchodnost dýchacích cest 4. Přivolat rychlou Záchranou službu. NIKDY SE NESNAŽIT DRŽET RUCE, NOHY NEBO STRKAT NĚCO DO ÚST
Transport	ANO

MDLOBA	
Příznaky	1. Zpomalení tepu, který je slabě hmatný 2. Výrazná bledost, obličej je pokryt potem. 3. Pocit závratí, potáčení, nevolnost,
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárničky)	1. Umožnit postiženému lepší prokrvení mozku - tzn. nohy výš než hlava, uvolnit těsný oděv 2. Umožnit přísun čerstvého vzduchu 3. Podání tekutiny
Transport	NE

CIZÍ TĚLESA A PŘEDMĚTY V RANÁCH

Příznaky	<ol style="list-style-type: none"> 1. Víme o kontaktu s kouskem dřeva, kovu, skla 2. Zaklíněné cizí tělo může být viditelné 3. Bolestivost a pohmatová citlivost
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárníčky)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jedná-li se o třísku vyjmeme ji pinzetou, dezinfikace 2. V případě velkého tělesa předmět nevynadáíme, pouze jej obložíme gázou a lehce zakryjeme
Transport	<p>NE - jedná-li se o předmět, který lze odstranit pinzetou</p> <p>ANO - v případě velkých předmětů, které nemůžeme odstranit sami</p>

KLÍŠTĚ

Příznaky	<ol style="list-style-type: none"> 1. Svědění v místě, kde je klíště zakouslé
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárníčky)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klíště bychom neměli zamazat krémem nebo olejem. Místo desinfikujeme 2. Klíště kývavým nebo krouživým pohybem za pomocí pinzety odstraníme 3. Po vyndání opět desinfikujeme
Transport	<p>NE - pokud není okolí rány zarudlé až fialové, v tom případě nutno navštívit co nejdříve lékaře</p>

PUCHÝŘE

Příznaky	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vznikají při popáleninách nebo při nevhodném oblečení či obuvi 2. Zarudnutí 3. Tenkostěnná bublina vyplněná tkáňovou tekutinou
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárníčky)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nepochichujeme 2. Sterilně je překryjeme produšným obvazem nebo polštářkovou náplastí
Transport	NE